Mode d'emploi du médicament HEXALYSE

Dans quel cas le médicament HEXALYSE est-il prescrit ?

Ce médicament d'usage local contient un antiseptique (biclotymol) et des substances à visée anti-inflammatoire.
Il est utilisé le traitement d'appoint des maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

Présentations du médicament HEXALYSE

HEXALYSE : comprimé à sucer (orangé) ; boîte de 24

Composition du médicament HEXALYSE

	p cp
Biclotymol	l 5 mg
Lysozyme	5 mg
Énoxolone	5 mg
Sucre glace	1,1 g

Substances actives : Biclotymol, Énoxolone, Lysozyme chlorhydrate
Excipients : Acide citrique monohydrate, Citron essence, Gomme arabique, Jaune orangé S, Magnésium stéarate, Sucre glace

Contre-indications du médicament HEXALYSE

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.
Attention
En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, de douleur en avalant ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin. Il pourra faire la différence entre une pharyngite et une angine. En cas d'angine bactérienne, un traitementantibiotique est nécessaire afin d'éviter des complications ultérieures, cardiaques ou rénales.
L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux (gargarisme, collutoire, pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.
Ce médicament contient du sucre en quantité notable.

Interactions du médicament HEXALYSE avec d'autres substances

Il est généralement inutile d'associer des antiseptiques différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en automédication: pastille, collutoire et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'utilisation ponctuelle de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement ne semble pas poser de problème particulier.

Mode d'emploi et posologie du médicament HEXALYSE

Les comprimés doivent être sucés lentement sans être croqués. Les prises doivent réparties au cours de la journée.
Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 6 ans : 6 à 8 comprimés par jour.

Effets indésirables possibles du médicament HEXALYSE

Rarement : réaction allergique.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.